

## Chapitre 4

# L'opérateur de troncature

### 4.1 Terme constant

Une fonction  $\varphi : G(\mathbb{A}) \rightarrow \mathbb{C}$  est dite à *croissance lente* s'il existe des réels  $c, r > 0$  tels que pour tout  $g \in G(\mathbb{A})$ , on ait

$$|\varphi(g)| \leq c|g|^r.$$

On écrit aussi «  $|\varphi(g)| \ll |g|^r$  pour tout  $g \in G(\mathbb{A})$  ».

Soit  $P \in \mathcal{P}$ , et soit  $\varphi$  une fonction sur  $U_P(F) \backslash G(\mathbb{A})$ , mesurable et localement  $L^1$ . On définit le terme constant  $\varphi_P = \Pi_P \varphi$  de  $\varphi$  le long de  $P$  par

$$\varphi_P(x) = \int_{U_P(F) \backslash U_P(\mathbb{A})} \varphi(ux) du, \quad x \in G(\mathbb{A}),$$

où  $du$  est la mesure de Tamagawa sur  $U_P(\mathbb{A})$  – i.e. celle qui donne le volume 1 au quotient  $U_P(F) \backslash U_P(\mathbb{A})$ . Alors  $\varphi_P$  est une fonction sur  $U_P(\mathbb{A}) \backslash G(\mathbb{A})$  mesurable et localement  $L^1$ . De plus, si  $\varphi$  est à croissance lente, resp. lisse, alors  $\varphi_P$  est à croissance lente, resp. lisse.

Pour  $P \in \mathcal{P}_{\text{st}}$ , on note  $\mathcal{R}_0^{P,+}$  l'ensemble des racines de  $T_0$  dans  $M_P$  qui sont positives par rapport à  $\Delta_0^P$ . Rappelons que l'on a fixé en section 3.4 un domaine de Siegel  $\mathfrak{S} = \mathfrak{B}_G \mathfrak{S}^*$  pour le quotient  $G(F) \backslash G(\mathbb{A})$ . Fixons aussi un sous-groupe ouvert compact  $\mathbf{K}'$  de  $G(\mathbb{A})^1$ .

Le lemme suivant [32, lemme I.2.7] est le résultat technique clef pour l'étude du terme constant dans le cas des corps de fonctions.

**Lemme 4.1.1.** *Soit  $P \in \mathcal{P}_{\text{st}}$ . Il existe une constante  $c_P > 0$  telle que si  $g \in \mathfrak{S}$  vérifie  $\langle \mathbf{H}_0(g), \alpha \rangle > c_P$  pour tout  $\alpha \in \mathcal{R}_0^{G,+} \setminus \mathcal{R}_0^{P,+}$ , alors, pour toute fonction  $\varphi$  sur  $G(F) \backslash G(\mathbb{A})$  invariante à droite par  $\mathbf{K}'$ , on a  $\varphi_P(g) = \varphi(g)$ .*

Ce lemme se généralise aux fonctions  $\varphi$  sur  $U_{P'}(\mathbb{A}) M_{P'}(F) \backslash G(\mathbb{A})$ , pour  $P' \in \mathcal{P}_{\text{st}}$  tel que  $P \subset P'$  : en remplaçant  $\mathcal{R}_0^{G,+}$  par  $\mathcal{R}_0^{P',+}$  dans la condition sur  $g$ , on obtient, de même,  $\varphi_P(g) = \varphi(g)$ . On a aussi la variante suivante [32, corollaire I.2.8] :

**Lemme 4.1.2.** *Il existe une constante  $c' > 0$  telle que pour tout  $T' \in \alpha_0$  tel que  $d_0(T') > c'$ , la propriété suivante soit vérifiée : pour tout  $P \in \mathcal{P}_{\text{st}}$ , tout  $g \in \mathfrak{S}$  tel que*

$$\begin{cases} \langle \alpha, \mathbf{H}_0(g) - T' \rangle > 0 & \text{pour tout } \alpha \in \Delta_P, \\ \langle \varpi, \mathbf{H}_0(g) - T' \rangle \leq 0 & \text{pour tout } \varpi \in \hat{\Delta}_0^P, \end{cases}$$

*et toute fonction  $\varphi$  sur  $G(F) \backslash G(\mathbb{A})$  invariante à droite par  $\mathbf{K}'$ , on a  $\varphi_P(g) = \varphi(g)$ .*

Pour  $Q, R \in \mathcal{P}$  tels que  $Q \subset R$ , et  $\psi$  une fonction sur  $U_Q(F) \backslash G(\mathbb{A})$  mesurable et localement  $L^1$ , on pose<sup>1</sup>

$$\Pi_{Q,R}\psi = \sum_{\{P \in \mathcal{P} \mid Q \subset P \subset R\}} (-1)^{a_P - a_R} \psi_P.$$

C'est encore une fonction sur  $U_Q(F) \backslash G(\mathbb{A})$ , mesurable et localement  $L^1$ .

**Lemme 4.1.3.** *Il existe une constante  $c'' > 0$  telle que pour tous les couples de sous-groupes paraboliques  $Q, R \in \mathcal{P}_{\text{st}}$  avec  $Q \subsetneq R$ , tout  $g \in \mathfrak{S}$  vérifiant*

$$\langle \alpha, \mathbf{H}_0(g) \rangle > c'', \quad \text{pour tout } \alpha \in \Delta_Q^R,$$

*et toute fonction  $\varphi$  sur  $G(F) \backslash G(\mathbb{A})$ , invariante à droite par  $K'$ , on ait*

$$\Pi_{Q,R}\varphi(g) = 0.$$

*Démonstration.* Il suffit d'adapter la démonstration de [32, corollaire I.2.9]. Par définition de  $\mathfrak{S}$ , il existe une constante  $c_1 < 0$ , telle que  $\langle \mathbf{H}_0(g), \delta \rangle > c_1$  pour tout  $g \in \mathfrak{S}$  et tout  $\delta \in \mathcal{R}_0^{G,+}$ . Fixons aussi une constante  $c_2 > 0$ , telle que pour tous  $P, P' \in \mathcal{P}_{\text{st}}$  tels que  $P \subset P'$ , on ait la version généralisée du lemme 4.1.1 : pour tout  $g \in \mathfrak{S}$  tel que  $\langle \mathbf{H}_0(g), \alpha \rangle > c_2$ , pour tout  $\alpha \in \mathcal{R}_0^{P',+} \setminus \mathcal{R}_0^{P,+}$ , et pour toute fonction  $\psi$  sur  $U_{P'}(\mathbb{A})M_{P'}(F) \backslash G(\mathbb{A})$ , invariante à droite par  $K'$ , on a  $\psi_{P'}(g) = \varphi(g)$ . Posons  $c'' = c_2 - c_1$ .

Soient  $Q, R \in \mathcal{P}_{\text{st}}$  tels que  $Q \subsetneq R$ , et soit  $g \in \mathfrak{S}$ . Posons

$$\Delta_Q^R(g) = \{\alpha \in \Delta_Q^R : \langle \alpha, \mathbf{H}_0(g) \rangle \leq c''\}.$$

L'ensemble des  $P \in \mathcal{P}$  tels que  $Q \subset P \subset R$  est en bijection avec l'ensemble des couples  $(\Theta, \Theta')$  avec  $\Theta \subset \Delta_Q^R(g)$  et  $\Theta' \subset \Delta_Q^R \setminus \Delta_Q^R(g)$ . Pour un tel couple  $(\Theta, \Theta')$ , on note  $P(\Theta, \Theta')$  l'élément de  $\mathcal{P}_{\text{st}}$  tel que  $Q \subset P(\Theta, \Theta') \subset R$ , défini par

$$\Delta_Q^{P(\Theta, \Theta')} = \Theta \cup \Theta'.$$

Puisque

$$a_{P(\Theta, \Theta')} - a_R = a_Q - a_R - (|\Theta| + |\Theta'|),$$

on a

$$\Pi_{Q,R}\varphi(g) = (-1)^{a_Q - a_R} \sum_{(\Theta, \Theta')} (-1)^{|\Theta| + |\Theta'|} \varphi_{P(\Theta, \Theta')}(g),$$

<sup>1</sup>Dans [25, section 4.3], cette fonction est notée  $\Theta\psi$ .

où  $(\Theta, \Theta')$  parcourt les couples comme ci-dessus. Fixé un tel couple, toute racine  $\alpha \in \mathcal{R}^{P(\Theta, \Theta'), +} \setminus \mathcal{R}^{P(\Theta, \emptyset), +}$  s'écrit  $\alpha = \beta + \delta$  avec  $\beta \in \Theta'$  et  $\delta \in \mathcal{R}^{P(\Theta, \Theta'), +} \cup \{0\}$ , et l'on a

$$\langle \alpha, \mathbf{H}_0(g) \rangle = \langle \beta, \mathbf{H}_0(g) \rangle + \langle \delta, \mathbf{H}_0(g) \rangle > c'' + \inf\{c_1, 0\} \geq c_2.$$

Par conséquent,  $\varphi_{P(\Theta, \Theta')}(g) = \varphi_{(\Theta, \emptyset)}(g)$ . On a donc

$$\Pi_{Q, R}\varphi(g) = (-1)^{a_Q - a_R} \left( \sum_{\Theta' \subset \Delta_Q^R \setminus \Delta_Q^R(g)} (-1)^{|\Theta'|} \right) \sum_{\Theta \subset \Delta_Q^R(g)} (-1)^{|\Theta|} \varphi_{P(\Theta, \emptyset)}(g).$$

Or, la somme sur  $\Theta'$  est nulle si  $\Delta_Q^G(g) \neq \Delta_Q^R$ , ce qui prouve le lemme.  $\blacksquare$

Pour  $Q = P_0$  et  $R = G$ , puisque l'ensemble des  $g \in \mathfrak{S}^*$ , tels que  $\langle \mathbf{H}_0(g), \alpha \rangle \leq c''$ , est compact, on a, en particulier [32, corollaire I.2.9] :

**Lemme 4.1.4.** *Il existe un sous-ensemble compact  $C = C_{K'}$  de  $\mathfrak{S}^*$  tel que, pour toute fonction  $\varphi$  sur  $G(F) \setminus G(\mathbb{A})$  invariante à droite par  $K'$ , le support de*

$$\Pi_{P_0, G}\varphi|_{\mathfrak{S}^*}$$

soit contenu dans  $C$ .

Soit  $Q \in \mathcal{P}_{\text{st}}$ . Pour  $T \in \mathfrak{a}_0$ , on définit un opérateur de troncature  $\Lambda^{T, Q}$  pour une fonction  $\varphi \in L^1_{\text{loc}}(Q(F) \setminus G(\mathbb{A}))$  par

$$\Lambda^{T, Q}\varphi(x) = \sum_{P \in \mathcal{P}_{\text{st}}, P \subset Q} (-1)^{a_P - a_Q} \sum_{\xi \in P(F) \setminus Q(F)} \widehat{\tau}_P^Q(\mathbf{H}_0(\xi x) - T)\varphi_P(\xi x).$$

D'après [25, lemme 3.7.1], la somme sur  $\xi$  est finie. Notons que l'opérateur  $\Lambda^{T, Q}$  ne dépend que de la projection  $T^Q$  de  $T$  sur  $\mathfrak{a}_0^Q$ . On pose

$$\Lambda^T = \Lambda^{T, G}.$$

Les résultats de [25, section 4.1] sur les propriétés de  $\Lambda^T$  sont vrais ici. En particulier, pour  $T$  assez régulier (i.e. tel que  $d_0(T) \geq c$  pour une constante  $c$  dépendant de  $G$ ), l'opérateur  $\Lambda^T$  est un idempotent [25, corollaire 4.1.3] : on a  $\Lambda^T \circ \Lambda^T \varphi = \Lambda^T \varphi$ .

**Définition 4.1.5.** Pour  $X \in \mathfrak{a}_0^G$  et  $T \in \mathfrak{a}_0^G$ , on définit<sup>2</sup>

$$T[[X]] = T[[X]]^Q \in \mathfrak{a}_0^Q$$

<sup>2</sup>On a utilisé les doubles crochets pour éviter les confusions avec la famille  $M_0$ -orthogonale  $([T]_P)$  définie par un élément  $T \in \mathfrak{a}_0$ .

en posant

$$T - X = \sum_{\alpha \in \Delta_0} x_\alpha \check{\alpha} \quad \text{et} \quad T \llbracket X \rrbracket = \sum_{\alpha \in \Delta_0^Q} x_\alpha \check{\alpha}.$$

Le raffinement [25, lemme 4.2.2] des propriétés de  $\Lambda^{T, Q}$  est encore vrai ici.

## 4.2 Troncature et support

Cette section adapte au cas des corps de fonctions les résultats de [25, section 4.3]. On fixe un  $T \in \alpha_0$ , assez régulier. La proposition suivante joue ici le rôle de [25, proposition 4.3.2]. Elle est très simple à prouver et fournit cependant des décroissances beaucoup plus radicales.

**Proposition 4.2.1.** *Soit  $K'$  un sous-groupe ouvert compact de  $G(\mathbb{A})$ . Il existe un sous-ensemble fermé  $\Omega = \Omega_{T, K'}$  de  $G(F) \backslash G(\mathbb{A})$  d'image compacte dans*

$$\mathfrak{B}_G G(F) \backslash G(\mathbb{A}),$$

*tel que, pour toute fonction  $\varphi$  sur  $G(F) \backslash G(\mathbb{A})$  invariante à droite par  $K'$ , le support de la fonction tronquée  $\Lambda^T \varphi$  soit contenu dans  $\Omega$ .*

*Démonstration.* On reprend la démonstration de l'assertion (2) du lemme I.2.16 de [32]. Fixons un élément  $T' \in \alpha_0$  assez régulier : on demande que la conclusion du lemme 4.1.2 soit vérifiée pour  $K'$ . Pour  $P \in \mathcal{P}_{\text{st}}$ , notons  $G(\mathbb{A})_{P, T'}$  l'ensemble des  $x \in G(\mathbb{A})$  vérifiant

$$\begin{cases} \langle \alpha, \mathbf{H}_0(x) - T' \rangle > 0 & \text{pour tout } \alpha \in \Delta_P, \\ \langle \varpi, \mathbf{H}_0(x) - T' \rangle \leq 0 & \text{pour tout } \varpi \in \hat{\Delta}_0^P, \end{cases}$$

et posons

$$\mathfrak{S}_{P, T'}^* = \mathfrak{S}^* \cap G(\mathbb{A})_{P, T'}.$$

D'après [25, lemme 4.1.1], pour  $P \in \mathcal{P}_{\text{st}}$  et  $x \in G(\mathbb{A})$ , si  $(\Lambda^T \varphi)_P(x) \neq 0$ , alors

$$\langle \varpi, \mathbf{H}_0(x) - T \rangle \leq 0, \quad \text{pour tout } \varpi \in \hat{\Delta}_P.$$

Grâce à [25, lemme 1.2.8], on en déduit que le support de  $(\Lambda^T \varphi)_P|_{\mathfrak{S}_{P, T'}^*}$  est contenu dans un compact de  $\mathfrak{S}^*$  indépendant de  $\varphi$ . En appliquant le lemme 4.1.2 à la fonction  $\Lambda^T \varphi$ , on obtient que le support de  $\Lambda^T \varphi|_{\mathfrak{S}_{P, T'}^*}$  est contenu dans un compact de  $\mathfrak{S}^*$  indépendant de  $\varphi$ . Puisque ([25, lemme 1.7.5])

$$\sum_{P \in \mathcal{P}_{\text{st}}} \phi_{P_0}^P \tau_P^G = 1,$$

on a  $G(\mathbb{A}) = \bigcup_{P \in \mathcal{P}_{\text{st}}} G(\mathbb{A})_{P, T'}$ . D'où la proposition. ■

Pour démontrer la proposition 4.2.1, on a utilisé la partition [25, lemme 1.7.5] de  $\alpha_0$ . On observe aussi que, d'après [25, lemme 3.6.4], on a

$$(4.1) \quad \Lambda^T \varphi(x) = \sum_{\substack{Q, R \in \mathcal{P}_{\text{st}} \\ Q \subset R}} A_{Q, R}^T \varphi(x),$$

avec

$$(4.2) \quad A_{Q, R}^T \varphi(x) = \sum_{\xi \in Q(F) \setminus G(F)} F_{P_0}^Q(\xi x, T) \sigma_Q^R(\mathbf{H}_0(\xi x) - T) \Pi_{Q, R} \varphi(\xi x).$$

Si  $Q = R$ , alors  $\sigma_Q^R = 0$ , sauf si  $Q = R = G$ , auquel cas

$$A_{G, G}^T \varphi(x) = F_{P_0}^G(x, T) \varphi(x).$$

On note  $\mathbf{C}^T$  l'opérateur  $A_{G, G}^T$ . Puisque la fonction  $F_{P_0}^G(\cdot, T)$  est invariante à gauche par  $\mathfrak{B}_G G(F)$  et que son support est d'image compacte dans  $\mathfrak{B}_G G(F) \setminus G(\mathbb{A})$ , il existe un sous-ensemble fermé  $\Omega^* = \Omega_{T, K'}^*$  de  $G(F) \setminus G(\mathbb{A})$ , d'image compacte dans  $\mathfrak{B}_G G(F) \setminus G(\mathbb{A})$ , tel que, pour toute fonction  $\varphi$  sur  $G(F) \setminus G(\mathbb{A})$  invariante à droite par  $\mathbf{K}'$ , le support de  $(\Lambda^T - \mathbf{C}^T)\varphi$  soit contenu dans  $\Omega^*$ . On a aussi la variante de [25, proposition 4.3.3] :

**Proposition 4.2.2.** *Soit  $\mathbf{K}'$  un sous-groupe ouvert compact de  $G(\mathbb{A})$ . Il existe une constante  $c = c_{\mathbf{K}'}$  (qui ne dépend pas de  $T$ ) telle que, si  $\mathbf{d}_0(T) \geq c$ , alors pour toute fonction  $\varphi$  sur  $G(F) \setminus G(\mathbb{A})$  invariante à droite par  $\mathbf{K}'$ , on a*

$$(\Lambda^T - \mathbf{C}^T)\varphi = 0.$$

*Démonstration.* Pour étudier  $(\Lambda^T - \mathbf{C}^T)\varphi(x)$ , on traite séparément chaque terme  $A_{Q, R}^T \varphi(x)$ , avec  $Q \neq R$  dans (4.1). On peut prendre  $x$  dans  $\mathfrak{S}$ . Pour  $\xi \in Q(F) \setminus G(F)$ , il s'agit de contrôler  $\Pi_{Q, R} \varphi(\xi x)$ , sous la condition

$$F_{P_0}^Q(\xi x, T) \sigma_Q^R(\mathbf{H}_0(\xi x) - T) = 1.$$

D'après [25, lemme 3.6.1], pour  $x$  fixé, il y a au plus un  $\xi$  modulo  $Q(F)$  tel que l'expression ci-dessus soit non nulle. Puisqu'on est libre de multiplier  $\xi x$  par un élément de  $Q(F)$ , on peut supposer que  $\xi x = uay \in \mathfrak{S}_{P_0}^Q(T_1, T)$  avec  $u \in U_Q(\mathbb{A})$ ,  $a \in \mathfrak{B}_0$  et  $y \in C_Q$  (cf. section 3.4). On peut même supposer que  $u \in \Omega_Q$  pour un compact  $\Omega_Q \subset U_Q(\mathbb{A})$ , tel que  $U_Q(F)\Omega_Q = U_Q(\mathbb{A})$ . Rappelons que  $C_Q$  est un compact fixé (assez gros, mais indépendant de  $T$ ) de  $G(\mathbb{A})$ , et que  $H = \mathbf{H}_0(\xi x)$  vérifie

$$\begin{cases} \langle \alpha, H - T_1 \rangle > 0 & \forall \alpha \in \Delta_0^Q, \\ \langle \varpi, H - T \rangle \leq 0 & \forall \varpi \in \hat{\Delta}_0^Q. \end{cases}$$

Puisque  $\sigma_Q^R(H - T) = 1$ , on a  $\langle \alpha, H \rangle > \langle \alpha, T \rangle$  pour tout  $\alpha \in \Delta_Q^R$ . Comme l'élément  $T - T_1$  est régulier, il existe  $c_1 \in \mathbb{R}$  (indépendant de  $T$ ) tel que  $\langle \alpha, H \rangle > c_1$  pour tout  $\alpha \in \mathcal{R}^{R,+}$ . D'après le lemme 4.1.3, il existe  $c'' > 0$  tel que, pour  $g \in \mathfrak{S}$  tel que  $\langle \mathbf{H}_0(g), \alpha \rangle > c''$ , pour tout  $\alpha \in \Delta_Q^R$ , on ait  $\Pi_{Q,R}\varphi(g) = 0$ , pour toute fonction  $\varphi$  sur  $G(F)\backslash G(\mathbb{A})^1$ , invariante à droite par  $\mathbf{K}'$ . Ici l'élément  $\xi x = uay$  n'appartient pas à  $\mathfrak{S}$ , mais  $H = \mathbf{H}_0(a) + \mathbf{H}_0(y)$ , et  $y$  reste dans un compact fixé, par conséquent il existe  $c'_1 \in \mathbb{R}$  (indépendant de  $T$ ) tel que  $\log|\alpha(a)| > c'_1$  pour tout  $\alpha \in \mathcal{R}^{R,+}$ . Puisque  $u$  reste dans un compact fixé de  $U_Q(\mathbb{A})$ , pour tout  $P' \in \mathcal{P}_{\text{st}}^R$ , la version généralisée du lemme 4.1.1 s'applique encore à  $\xi x$  (cf. la preuve du lemme I.2.7 de [32]), et quitte à modifier la constante  $c''$ , la conclusion du lemme 4.1.3 s'applique encore à  $\xi x$ . D'où la proposition. ■

La différence par rapport au cas des corps de nombres est ici spectaculaire : sur un corps de nombres  $F$ , pour toute fonction lisse à croissance uniformément lente  $\varphi$  sur  $\mathfrak{B}_G G(F)\backslash G(\mathbb{A})$ , la fonction  $\mathbf{\Lambda}^T \varphi$  est seulement à décroissance rapide. Par ailleurs la décomposition

$$\mathbf{\Lambda}^T = \mathbf{C}^T + (\mathbf{\Lambda}^T - \mathbf{C}^T),$$

qui joue un rôle crucial dans les estimées de [25, chapitres 12 et 13], est bien plus simple à contrôler, car ici, pour toute fonction  $\mathbf{K}'$ -invariante à droite sur  $G(F)\backslash G(\mathbb{A})$ , non seulement  $\mathbf{\Lambda}^T \varphi$  est à support d'image compacte dans  $\mathfrak{B}_G G(F)\backslash G(\mathbb{A})$ , mais si  $T$  est assez régulier, la troncature est encore plus brutale : on a  $\mathbf{\Lambda}^T \varphi = \mathbf{C}^T \varphi$ . Cela simplifiera, plus loin, la preuve des estimées à établir.